



شماره سند: AH-Edu-PA-108-00

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰


تاریخ بازنگری: ۰۶/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

همانژیوم



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان کودکان اکبر

ولاد آموزش به بیمار

همانژیوم پوستی

در صورتی که همانژیوم منجر به ایجاد زخم یا ضایعه در محل شود نیاز به درمان است. راه های معمول درمان آن عبارتند از:

- مصرف داروهای کورتیکواستروئید: باعث کاهش رشد و از بین رفتن التهاب در محل می شوند.
- برداشتن توده با عمل جراحی یا لیزر: در صورتی که همانژیوم بسیار بزرگ باشد یا در نقطه ای حساس مانند چشم رشد یافته باشد، استفاده از عمل جراحی ضروری است. درمان اصلی طبی و با ایندراال شروه می شود که بهتر است ابتدا در بیمارستان شروع و کنترل عوارض هیپوگلیسمی و هیپوتانسیون انجام شود و طول دوره درمان ۶ ماه تا یکسال می باشد.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

منبع: www.uptodate.com

اُدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه — بیمارستان کودکان

اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱ کلینیک آموزش سلامت



علل و عوامل همانژیوم

در مورد علل همانژیوم دقیقاً مشخص نیست که همانژیوم از چه چیزی ایجاد می شود، هر چند که برخی باور دارند که کار پروتئین است. اما یک سری عوامل هستند که استعداد ابتلا به همانژیوم را افزایش می دهند از جمله:

- مؤنث بودن
- نارس بودن نوزاد
- سفید بودن نوزاد



درمان :

همانژیوم کوچک و منفرد معمولاً نیاز به درمان خاصی ندارد و پس از مدتی خود به خود از بین می رود اما در برخی موارد همانژیوم به درمان نیاز دارد.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکتان باشیم.

همانژیوم چیست؟

همانژیوم به توده‌ها یا تومورهای غیر سرطانی رگ‌های

خونی گفته می‌شود. این تومورها شایع‌ترین تومورها در میان کودکان هستند و خبر خوبی که در ارتباط با آن‌ها وجود دارد این است که عموماً بدون درمان خاصی از بین می‌روند.



علائم همانژیوم

همانژیوم معمولاً علامت خاصی ایجاد نمی‌کند، اما در کل علامت اصلی همانژیوم پوستی وجود توده‌های قرمز روی پوست است. در واقع به سبب قرمز و کوچک بودن همانژیوم‌های پوستی گاه به آن‌ها **همانژیوم‌های توت‌فرنگی** نیز گفته می‌شود. این توده‌ها بر روی سر و گردن ایجاد می‌شوند. اما همانژیوم داخلی عموماً بدون علامت است مگر آن که یا همانژیوم خیلی بزرگ شود و یا آن که تعداد همانژیوم‌ها زیاد شود. در چنین شرایطی، برخی علائم بروز می‌کنند از جمله:

1. حالت تهوع
2. استفراغ
3. از دست دادن اشتها
4. کاهش وزن ناگهانی
- 5- احساس پری در شکم

تشخیص همانژیوم

هیچ آزمایش اختصاصی و ویژه‌ای برای تشخیص همانژیوم پوستی وجود ندارد، بلکه پزشک از طریق تست‌های بصری و بررسی‌های خود می‌تواند همانژیوم پوستی را تشخیص دهد. اما برای تشخیص همانژیوم داخلی از آزمایش‌هایی مانند ام.آر.آی، سی.تی اسکن و حتی سونوگرافی استفاده می‌شود

