



شماره سند: AH-Edu-PA-90-01
تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۸/۲۰
تاریخ بازنگری: ۰۶/۴/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴/۸/۲۱



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شیگلوز



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز موارد ذیل باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

وجود خون در مدفوع

دل درد و دل پیچه هنگام دفع

پوست خشک

چشمان خشک

اسهال همراه با استفراغ

ضعف و بی حالی شدید



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱



تغذیه با شیر مادر برای کودکان زیر ۲ سال

از دادن آب میوه، نوشابه، آب نبات، سبزیجات، سوپ

حاوی سبزی، مواد قندی مانند شیرینی جات، شکلات

، بیسکویت و آجیل خودداری شود.

مصرف فراورده های پروبیوتیک مانند ماست

پروبیوتیک و نیز فراورده های زینک در درمان اسهال

موثر است.

جهت استفاده پودر ORS هر بسته را با چهار لیوان

آب جوشیده سرد شده اضافه کنید و با توجه به وزن

کودک و دفعات اسهال به کودک بدهید.



علل، علائم و راه های درمان اسهال خونی

www.atfarak.com

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماسست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



شیگلوز :

نوعی بیماری باکتریال دستگاه گوارش است.

راه انتقال: بیماری بیشتر در کودکان ۱ تا ۱۰ سال دیده میشود.

این ارگانیسم بر روی اجسام بی جان زنده میماند بنابراین انتقال آن در مراکز نگهداری کودکان و داخل خانواده ها تسهیل می یابد.

انسان و بعد از آن **آب آلوده** میتواند مهمترین منبع آلودگی باشد.

بیماری زایی:

باکتری بعد از رسیدن به روده کوچک در این محل تقسیم شده و سمی آزاد میکند که باعث ترشح آب و الکترولیتها شده و به سلولهای مجاورسرایت میکند و آنها را از بین میبرد.

تظاهرات بالینی:

تب

کرامپ شکمی

درد شکم

اسهال آبکی همراه با خون و بلغم

تمایل زیاد به اجابت مزاج

حساسیت منتشر قسمت تحتانی شکم

مراقبت و درمان:

هدف درمان برقراری و تداوم تعادل الکترولیتی و برطرف کردن امکان سرایت شیگلوز به دیگران است.

برای برقراری تعادل آب و الکترولیت بدن میتوان از محلول ORS و در موارد کم آبی شدید مایعات داخل رگ تجویز شود.

• با انجام آزمایش مدفوع میتوان میکروب را از

مدفوع جدا کرد و برای تعیین آنتی بیوتیک

مناسب آزمون حساسیت انجام داد

• در آزمایش خون گلبولهای سفید افزایش می

یابد. همچنین در مدفوع گلبولهای سفید و

قرمز دیده میشود.

• توجه: عدم استفاده از داروهایی که باعث بند

آمدن اسهال میشود زیرا سبب طولانی شدن

علائم میکروب در روده میشود..

• توصیه های پرستار به بیمار:

• جهت کاستن خطر پخش عفونت ایزولاسیون

بیمار رعایت شود.

• شستشوی مکرر دستهای مادر و کودک بعد

از خروج از دستشویی و قبل از تغذیه

• خودداری از استفاده از اسباب بازی

مشترکین کودکان

• تعویض زود به زود دیپیر برای جلوگیری از

آسیب به پوست کودک

• در صورت قرمزی پوست در معرض هوا قرار

گیرد و از پماد زینک اکساید استفاده شود