



شماره سند: AH-Edu-PA-39-01
تاریخ تدوین: ۹۸/۱/۲۰
تاریخ بازنگری: ۰۲/۲/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۸/۱



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ختنه



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

مراقبت های بعد از عمل:

- ۱- پانسمان ناحیه تا ۳-۵ روز باقی بماند زیرا باعث می شود که زخم با پوشک در تماس نباشد و تمیز بماند
- ۲- ترشح زرد رنگی چند روز روی ناحیه برش ممکن است دیده شود.
- ۳- در صورت خونریزی، تورم، قرمزی وسیع باید به مراکز درمانی مراجعه کنید.
- ۴- بعد از ختنه نیاز به هیچ گونه درمان اضافی و پماد های مختلف نیست.

زمان انجام:

معمولا بهتر است در ابتدای تولد قبل از ترخیص از بیمارستان انجام شود.

اما برخی از والدین تحمل این عمل برای نوزاد را ندارند و تصمیم می گیرند به تعویق بیندازند این مورد بستگی به فرهنگ و تصمیم آن ها دارد.

قبل از سه ماهگی معمولا با بی حسی موضعی اما بعد از آن با بیهوشی عمومی انجام می شود.

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه- بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱

مطالعاتی نشان می دهد که نوزادان در طول ختنه

چه علائمی مبنی بر درد را دارند.

گریه، افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون از این علائم هستند.

جهت کاهش درد عوامل زیر موثرند:

- حضور پدر مادر و آرام کردن کودک
- محلول های قندی
- دادن استامینوفن

پزشک قبل از انجام ختنه باید توضیحات کامل را در اختیار پدر و مادر بگذارد.

چندین عامل باعث به تاخیر انداختن ختنه

می شود شامل:

- نوزاد نارس
- نقص در سیستم تناسلی و نیاز به مشورت با جراح یا اورولوژیست کودکان
- سابقه ی خانوادگی اختلالات خونریزی

دهنده

والدین گرامی:


این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

ختنه در پسران یعنی برداشتن پوست کلاهک آلت تناسلی و از دوران قدیم رایج شده است. ابتدا در مصر باستان انجام می شد. و بعد ها در بین مسلمانان و یهودیان

ختنه به دو صورت عمل جراحی و سرپایی انجام می شود. اطلاعات دقیقی از این کدام بیشتر انجام می شود یا کدام نوع بهتر است وجود ندارد.



در هنگام تولد این پوست اضافه یک قسمت جدا که

چسبیده روی آلت می باشد که و جدا شدگی کامل این قسمت در سنین مختلف ایجاد می شود. که در پسرانی که ختنه نشده اند فضایی را جهت تجمع آلودگی ایجاد می کند.

برخی از والدین ممکن است از ختنه کردن کودکان ترس داشته باشند. در این صورت باید تا زمان ختنه بهداشت آن ناحیه رعایت شود.

اثرات سودمند ختنه:

۱- کاهش عفونت مجرای ادراری

۲- کاهش بروز سرطان

۳- کمتر شدن بروز التهاب و سایر مشکلات در ناحیه تناسلی

۴- بهداشت مناسب ناحیه تناسلی

اما برای موارد فوق فقط ختنه کردن کافی نیست و الزما ختنه باعث بهبود تمام موارد نمی شود.

اثرات نا مطلوب در صورت انجام ختنه

توسط افراد ناوارد:

- برداشتن میزان ناکافی پوست که منجر به ظاهر نامناسب می شود.
- خونریزی
- عفونت در صورت خیف بودن با آنتی بیوتیک درمان می شود.
- منجر به بریدن قسمت پنیس (آلت) می شود
- منجر به ایجاد چسبندگی یا کیست می شود.
- یا اثر زخم روی آلت باقی می ماند.
- در صورت جراحی عوارض بیهوشی نیز محتمل است.

