



شماره سند: AH-Edu-PA-1-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۲/۲/۱۹

تاریخ آخرین ویرایش: ۹۸/۰۷/۲۹



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آترزی (عدم تشکیل کامل) مری



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه

نمایید:

- تب، سرفه، تنفس مشکل
- کبود شدن لبها، انگشتان و پوست
- استفراغ
- قطع تنفس
- عدم وزن گیری



با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ داخلی ۱۲۱



بعد از عمل ممکن است مشکلاتی مثل سوزش
سردل و سرفه یا بلع مشکل و عدم تحمل
تغذیه داشته باشد که باید اطلاع دهید.

مراقبت در منزل:

- پس از ترخیص حمام و تغذیه کودک به
طور معمول می تواند انجام شود.
- داروهای ضد اسید تا ۶ ماه معمولاً باید
مصرف شود.
- در زمان تغذیه سر کودک بالاتر قرار بگیرد.
- جهت بررسی بیشتر به پزشک مراجعه
نمایید.



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکانمان باشیم.




تعریف:

در این بیماری مری با معده اتصال طبیعی ندارد و به همین دلیل تغذیه با خطراتی همراه است.

گاهی همراه فیستولی به داخل مجاری تنفسی هم می باشد که منجر به ورود مواد به ریه می شود.

این بیماری یک نقص مادر زادی هنگام تولد است. اما ژنتیکی نیست.



علائم:

- کبود شدن کودک حین تغذیه
- سرفه و آروغ زدن
- خوب غذا نخوردن
- آبریزش از دهان
- تنفس مشکل

تشخیص براساس معاینه و شرح حال و همچنین

روش های:

- عبور نکردن سوند معده
- عکس ساده یا در مواردی عکس با ماده حاجب
- سونوگرافی جهت تشخیص سایر اختلالات مری



درمان:

جراحی

اگر مواد غذایی به ریه راه پیدا کرده و منجر به عفونت ریه شده باشد باید درمان عفونت نیز انجام شود.

تا زمانی که بتواند از راه دهان چیزی بخورد باید مایعات از طریق رگ دریافت کند. معمولاً یک هفته بعد از عمل می تواند غذا و نوشیدنی بخورد.

ممکن است کودک علاوه بر این دارای مشکلات قلبی و معده نیز باشد که با عکس ساده و سونوگرافی مشخص می شود و طی عمل جراحی این موارد را نیز اصلاح می کنند.