



شماره سند: AH-Edu-PA-16-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۲۰


تاریخ بازنگری: ۹۸/۳/۱۸

تاریخ آخرین ویرایش: ۹۸/۷/۲۵



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آندوسکوپی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت این علائم به پزشک یا پرستار اطلاع

دهید.

- درد شدید شکمی
- نفخ شدید شکم
- استفراغ
- تغییر دمای بدن
- بلع مشکل
- احساس صدای خش خش زیر پوست گردن

آموزش به والدین بعد از انجام آندوسکوپی:

- تا زمانی که کودک کاملاً هوشیار نشده نباید از طریق دهان چیزی بخورد. و بعد از هوشیاری کامل ابتدا مایعات و سپس از هر ماده غذایی می تواند استفاده کند.
- بعد آندوسکوپی اکثر بیماران احساس خوبی دارند اما گاهی ممکن است احساس خستگی داشته باشند که توصیه می شود استراحت کنند.

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱

در حین آندوسکوپی، علائم حیاتی مثل ضربان قلب، فشار خون و سطح اکسیژن بررسی می شود.

و جهت باز شدن معده مقداری گاز اکسیژن را وارد معده می کنند. تا بهتر دیده شود.

و حدوداً ۱۰-۲۰ دقیقه زمان می برد. معمولاً نمونه بیوپسی از قسمت های مختلف میگیرند و جهت بررسی به آزمایشگاه می فرستند.

عوارض:

- آسیب به مایع پس از آندوسکوپی به درون ریه
- عارضه داروی بیهوشی (قبل از آندوسکوپی در صورت حساسیت به این نوع از دارو ها اطلاع بدهید).
- خونریزی از ناحیه بیوپسی (نمونه برداری)
- پارگی در لوله گوارشی حین آندوسکوپی



والدین گرامی:


این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

آندوسکوپي این امکان را فراهم می آورد که پزشک به صورت مستقیم قسمت فوقانی دستگاه گوارش شامل مری، معده، و قسمتی از روده باریک را مشاهده کند.

پزشک التهاب و قرمزی، زخم یا تومور را بررسی می کند.



دلایل آندوسکوپي :

- درد در ناحیه فوقانی شکم
 - بازگشت اسید معده به مری
 - تهوع و استفراغ مداوم
 - خونریزی گوارشی (استفراغ خونی یا مدفوع خونی مثل قیر)
- در حین آندوسکوپي خونریزی گوارشی مورد درمان قرار می گیرد.
- بلع مشکل
 - بلع ماده خارجی
 - بررسی تومور و زخم یا پولیپ
 - بلع مواد سوزاننده



آمادگی های قبل از آندوسکوپي:

الف- قبل از انجام آندوسکوپي موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید :

- اگر کودکان داروی خاصی مصرف می کند.
- اگر کودکان به داروی خاصی مثل داروهای بیهوشی حساسیت دارد.
- اگر کودکان مشکل انعقادی دارد یا داروهای رقیق کننده خون مثل هپارین یا داروهای حاوی آسپرین دریافت می کند.
- اگر کودکان بیماری قلبی دارد.
- اگر کودکان علائم سرماخوردگی (سرفه، عطسه و یا تب) دارد.

ب - ۶ ساعت قبل از آندوسکوپي باید کودکان ناشتا باشد.

اقدامات حین آندوسکوپي:

داروی آرامبخش تزریق می شود تا کودک در موقع انجام آندوسکوپي آرام باشد.