



شماره سند: AH-Edu-PA-92-01
تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰
تاریخ بازنگری: ۰۲/۲/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۸/۸/۲



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نمونه برداری از کبد



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه

نمایید:

- درد شدید
- کوتاهی تنفس
- درد قفسه سینه
- خونریزی از محل بیوپسی
- تب
- درد شکم
- تپش قلب
- مدفوع خونی
- کاهش هوشیاری
- تهوع و استفراغ
- ورم شکم یا اندام ها



با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۳۱



اقدامات بعد:

- توصیه می شود جهت کاهش خونریزی به پهلوی راست دراز بکشد.
- وسیله سنگین تا ۱ هفته بلند نکند.
- جهت مصرف داروها بعد از آن با پزشک مشورت کنید.

عوارض:

- خونریزی
- عفونت
- مشکلات ریوی
- آسیب به کیسه صفرا یا اعضای نزدیک به کبد
- درد در شانه سمت راست
- کاهش فشار خون
- درد در محل بیوپسی
- بی قراری

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

کبد یکی از اعضای بدن است که در سمت راست و فوقانی شکم قرار دارد و عملکرد های ضروری برای بدن انجام می دهد.

بیوپسی کبد اقدامی است که یک برش کوچک از کبد را بر می دارند و سپس در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد.



دلایل بیوپسی کبد:

- ارزیابی برخی از بیماری های مزمن کبد
- ارزیابی برخی از توده های کبدی

اقدامات قبل از بیوپسی:

- آزمایش خون و بررسی زمان لخته شدن خون
- جهت جلوگیری از خونریزی
- سونوگرافی کبد
- هرگونه داروی مصرفی را به پرستار بگویید.
- داروهای که نباید قبل از نمونه برداری کبد مصرف شوند:
- آسپرین
- ضدالتهاب ها مثل ایبوپروفن و ناپروکسن
- وارفارین
- داروهای قلبی
- داروهای گیاهی مثل روغن ماهی و...
- ۶ ساعت قبل از چیزی نخورید.

اقدامات حین بیوپسی:

- در بیمارستان قابل انجام است.
- سوزن مخصوص را از طریق پوست وارد کبد می کنند.
- کودک به پشت بخوابد.
- ابتدا رگ محیطی جهت تجویز مایعات، برقرار می شود.
- ممکن است داروهای آرامبخش تجویز شود.
- در چند ثانیه سوزن را از روی پوست وارد کبد می کنند و بیرون می آورند.
- بدون بخیه و برش بزرگ انجام می شود.
- سپس یک پانسمان کوچک در ناحیه قرار می دهند.