



شماره سند: AH-Edu-PA-20-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۲۰


تاریخ بازنگری: ۹۸/۳/۱۹

آخرین ویرایش: ۹۸/۷/۲۵



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کولونوسکوپی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

عارضه ها:

خونریزی

پارگی روده

اثرات داروهای بیهوشی

در صورت علائم زیر به پزشک یا پرستار اطلاع

دهید:

- درد شکم شدید
- نفخ شکم
- استفراغ
- تب
- خونریزی از مقعد



با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱



۳-کودک شش ساعت قبل از کولونوسکوپی ناشتا باشد.

در حین انجام کولونوسکوپی:

توسط متخصص بیهوشی به کودک داروی آرام بخش تزریق می شود و هیچ چیزی احساس نمی کند.

کولونوسکوپی حدود نیم تا یک ساعت طول می کشد.

آموزش به والدین بعد از انجام کولونوسکوپی:

بعد از انجام آن تا زمانی که کودک کاملاً هوشیار نشده نباید از طریق دهان چیزی بخورد. و بعد از هوشیاری کامل ابتدا مایعات و سپس از هر ماده غذایی می تواند استفاده کند.

برخی از نتایج را پزشک بلافاصله به شما خواهد گفت ولی نمونه های بافتی که حین کولونوسکوپی گرفته می شود برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده خواهد شد که نتایج آن چند روز طول می کشد.



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

برای بررسی دیواره داخلی مقعد و روده بزرگ (کولون) از این روش استفاده می شود.

کولونوسکوپ چیست؟

کولونوسکوپ دستگاهی است که از یک لوله قابل انعطاف با قطری به اندازه یک انگشت و طول حدود ۱/۵ متر تشکیل شده و مجهز به یک منبع نوری برای دیدن درون روده بزرگ (کولون) و یک دوربین بسیار کوچک ویدیویی که برای تصویربرداری از روده می باشد. کولونوسکوپ امکان تشخیص توده ها، نقاط دچار خونریزی و التهاب را به پزشک معالج می دهد.



دلایل کولونوسکوپی:

سرطان یا پولیپ روده بزرگ
خونریزی گوارشی
تغییر عادات روده مثل اسهال
سابقه ی خانوادگی سرطان کولون
درد مزمن شکم یا مقعد
نرمال نبودن عکس یا سی تی اسکن روده ها

آمادگی های قبل از کولونوسکوپی:

۱- قبل از انجام کولونوسکوپی موارد زیر را به

پزشک اطلاع دهید :

- اگر کودکان داروی خاصی مصرف می کند.
- اگر کودکان به داروی خاصی مثل داروهای بیهوشی حساسیت دارد.
- اگر کودکان مشکل انعقادی دارد یا داروهای رقیق کننده خون مثل هپارین یا داروهای حاوی آسپرین دریافت میکنند.
- اگر کودکان بیماری قلبی دارد..
- اگر طی ۴ روز قبل باریم انما برای کودکان انجام شده است.
- اگر کودکان علائم سرماخوردگی (سرفه، عطسه و یا تب) دارد.

۲- قبل از کولونوسکوپی باید روده کاملاً از مدفوع

پاک شود تا دید کافی جهت بررسی آن وجود داشته باشد، لذا ممکن است پزشک توصیه کند برخی از موارد زیر را رعایت کنید:

- کودک دو روز قبل از انجام کولونوسکوپی نباید غذاهای جامد و مواد غذایی قرمز رنگ مصرف کند. زیرا می تواند ترشحات روده را قرمز کرده و با خون اشتباه شود.
- کودک دو روز قبل از آزمایش، پودر پیدرولاکس یا داروی دیگر باتوجه به نظر پزشک مصرف نماید.
- کودک مایعات فراوان مانند چای کم رنگ، آب میوه و آب مصرف کند تا دچار کم آبی نشود و روده اش هم تمیز شود.
- مصرف قرص آهن و داروهای حاوی آهن از ۲ روز قبل قطع می شود زیرا آهن می تواند رنگ پوشش داخلی (روده بزرگ) کولون را تغییر دهد.
- مسهل تجویز شده توسط پزشک معالج مصرف شود.
- کودک از ۲ روز قبل فقط سوپ صاف شده و آب گوشت استفاده کند.