



آترزی (عدم تشکیل کامل) مری



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر ولحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه

ما يد:

- تب، سرفه، تنفس مشکل
 - کبود شدن لبها، انگشتان و پوست
 - استفراغ
 - قطع تنفس
 - عدم وزن گیری



سكن کد با نرم افزار بارکد خوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

بایا آرزوی سلامتی برای کودک عزیزان

ଓର୍ବଲାକ୍ଷ୍ମୀନାଥଙ୍କ ପଦବୀ

www.nursingconsult.com: نسبت

www.uptodate.com

۹درسن پیما رستان: پلواز شهید کاوه—پیما رستان کودکان اکبر

፩፻፲፭-፳፻፲፭



بعد از عمل ممکن است مشکلاتی مثل سوزش سردل و سرفه یا بلع مشکل و عدم تحمل تغذیه داشته باشد که باید اطلاع دهید.

مراقبت در منزل:

- پس از ترخیص حمام و تغذیه کودک به طور معمول می‌تواند انجام شود.
 - داروهای ضد اسید تا ۶ماه معمولاً باید مصرف شود.
 - در زمان تغذیه سر کودک بالاتر قرار بگیرد.
 - جهت بررسی بیشتر به پزشک مراجعه نمایید.



والدین گرامی:

این پمقلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شمام است. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکتان باشیم.


۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تعريف:

در این بیماری مری با معده اتصال طبیعی ندارد و به همین دلیل تغذیه با خطراتی همراه است.

گاهی همراه فیستولی به داخل مجرای تنفسی هم می باشد که منجر به ورود مواد به ریه می شود.

این بیماری یک نقص مادرزادی هنگام تولد است. اما ژنتیکی نیست.



علائم:

- کبودشدن کودک حین تغذیه
- سرفه و آروغ زدن
- خوب غذا نخوردن
- آبریزش از دهان
- تنفس مشکل

تشخیص براساس معاينه و شرح حال و همچنین

روش های:

- عبور نکردن سوند معده
- عکس ساده یا در مواردی عکس با ماده حاجب
- سونوگرافی جهت تشخیص سایر اختلالات مری



درمان:

جراحی

اگر مواد غذایی به ریه راه پیدا کرده و منجر به عفونت ریه شده باشد باید درمان عفونت نیز انجام شود.

تا زمانی که بتواند از راه دهان چیزی بخورد باید مایعات از طریق رگ دریافت کند. معمولاً یک هفته بعد از عمل می تواند غذا و نوشیدنی بخورد.

ممکن است کودک علاوه براین دارای مشکلات قلبی، و معده نیز باشد که با عکس ساده و سونوگرافی مشخص می شود و طی عمل جراحی این موارد را نیز اصلاح می کنند.

