



شماره سند: AH-Edu-PA-18-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۱۸

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بلع مواد سوزاننده در کودکان



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

نکته:

- مواد سوزاننده (آب باطری، سفیدکننده ظروف، تمیز کننده سطوح، لوله باز کن و.....) را از دسترس کودکان دور نگه دارید و داخل کابینت زیر سینک یا موارد مشابه قرار ندهید.
- حتما این مواد را در کمد درب دار و دارای قفل نگهداری شوند.
- در هنگام استفاده از مواد شوینده، در صورتی که مقداری از آن در پایان کار باقی ماند حتما دور ریخته شود.
- مواد سوزاننده را در داخل ظروف غیر مرتبط مانند بطری نوشابه، دلستر، آب معدنی و..... نگهداری نکنید.
- خودداری از بازی کردن کودکان در مکانی دور از دید والدین



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان
جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه- بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱



اقدامات لازم در مراکز درمانی:

- ناشتا کردن و سرم درمانی کودک
- انجام آندوسکوپی
- دارو درمانی با توجه به وضعیت کودک



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



خوردن مواد سوزاننده اسیدی یا قلیایی در کودکان ۱ تا ۵ سال شایع تر است.

محلول های لوله بازکن، آب باطری، ضد عفونی کننده، مایعات سفیدکننده، شوینده ها، جوهرنمک و... جزء مواد سوزاننده ای هستند که به طور نسبتا شایع در کودکان باعث سوختگی دستگاه گوارش (مری، معده و...) می شوند.

علائم:

- آبریزش دهان
- بی قراری
- بلع مشکل
- استفراغ خونی یا غیر خونی
- درد شکم
- سوختگی دهان و لب
- تنگی نفس

نکته:

ممکن است زخم و قرمزی در اطراف لبها یا داخل دهان کودک دیده نشود، اما همزمان سوختگی شدیدی در قسمتهای داخلی دستگاه گوارش (مری، معده) وجود داشته باشد بنابراین هر چه سریعتر کودک را نزد پزشک ببرید.



اقدامات لازم توسط والدین:

- شستن اطراف دهان و پوست آن محل با آب فراوان
- انتقال هر چه سریعتر کودک به مراکز درمانی
- خودداری از وادار کردن کودک به استفراغ
- خودداری از خوردن و آشامیدن
- خودداری از مصرف مواد خنثی کننده
- همراه داشتن ظرف حاوی موادی که کودک خورده است جهت کمک به پزشک برای تصمیم گیری بهتر
- در ساعت اول بلع مواد سوزاننده می توان در صورت عدم وجود تهوع و استفراغ مقدار کمی شیر یا آب به بیمار خوراند.

