




شماره سند: AH-Edu-PA-6-01
تاریخ تدوین: ۱۳۹۸/۲/۲۰
تاریخ بازنگری: ۰۴/۲/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۰۴/۲۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد



تومور مغزی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

مراقبت از اندام ها

- ♦ فیزیوتراپی و ماساژ اندام ها جهت جلوگیری از تحلیل و ضعف عضلات
- ♦ بالاتر نگه داشتن اندام ها از سطح بدن برای جلوگیری از تشکیل لخته ی خون در اندامها
- ♦ مراقبت از مخاط ها
- ♦ بستن و مرطوب نگه داشتن چشم ها در صورت بسته نشدن کامل پلک ها جهت پیشگیری از خشکی قرنیه
- ♦ شستشوی دهان با محلول زدهانشویه کلرهگزیدین و یا سرم نمکی و جلوگیری از خشک شدن مخاط دهان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

با آرزوی سلامتی برای کودک دلبندتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱



تعویض منظم لوله بینی—معدی

بسته به شرایط بیمار هر دو هفته یک بار باید تعویض شود

در صورت ماندگاری بیشتر حتما پزشک روش دیگری را برای بیمار پیشنهاد می کند

مراقبت پوستی

- ♦ تغییر وضعیت بیمار هر ۲ ساعت و ماساژ پشت
- ♦ استفاده از تشک موج
- ♦ صاف بودن ملحفه زیر بیمار و پرهیز از مرطوب شدن آن

مراقبت ادراری

- کنترل کارکرد سوند ادراری یا شیت ادراری بیمار و تنظیم مجدد آن
- کیسه ی ادراری پایین تراز سطح بدن باشد
- بیمار روی تخت بوده و ترجیحا تشک موج داشته باشد



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تومور مغز:

رشد یک توده غیر طبیعی در مغز که امکان دارد خوش خیم یا بدخیم باشد.

علل:


بسیاری از بیماری‌ها علت آن ناشناخته است ولی برخی عوامل در بروز آن موثر است. از جمله سیگار، رژیم غذایی نامناسب (پر چرب، ...)، استرس و ...

خطرناک بودن تومور مغزی بستگی دارد به:

- خوش خیم یا بدخیم بودن
- محل و اندازه ی تومور
- زمان تشخیص بیماری

علائم تومور مغزی به محل آن در مغز متفاوت است علایمی که اغلب در مراحل اولیه ظاهر میشود شامل:

- ♦ سردرد
- ♦ استفراغ (گاهی بدون حالت تهوع)
- ♦ تغییر وضعیت هوشیاری (خواب آلودگی)
- ♦ افزایش قطر جمجمه و برآمده شدن ملاج ها در کودکان
- ♦ سایر علایم بیماری شامل: اختلالات شناختی، اختلالات رفتاری، اختلالات شخصیتی، اختلال حسی یا حرکتی در اندام ها، اختلال در حس بویایی شنوایی و یا بینایی، دو بینی، سرگیجه، تشنج و ...



تشخیص:

- ♦ معاینه ی دستگاه عصبی توسط پزشک
- ♦ سی تی اسکن مغز
- ♦ MRI مغز
- ♦ نمونه برداری از مغز
- ♦ درمان

♦ جراحی

مراقبت تنفسی و راه هوایی

- * ساکشن ترشحات حلق و لوله تراکئوستومی
- * شستشوی لوله داخلی تراکئوستومی
- * فیزیوتراپی تنفسی، تشویق و تحریک بیمار به سرفه و تنفس عمیق، وضعیت نشسته برای بیمار
- * استفاده از بخور

قبل از ترخیص این موارد را از پرستار خود یاد بگیرید

مراقبت گوارشی

- ♦ رژیم غذایی پر فیبر (سبزیجات و میوه جات ...)
- ♦ دادن مایعات از طریق لوله بینی-معدی به فاصله ی هر ۳ ساعت به مقدار تعیین شده
- کنترل تحمل رژیم غذایی و دادن وضعیت نیمه نشسته تا نشسته قبل از تغذیه بیمار و حفظ این وضعیت تا یکساعت بعد از تغذیه

