



شماره سند: AH-Edu-PA-21-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰


تاریخ آخرین بازنگری: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آپاندیسیت

(التهاب آپاندیس)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه
نمایید:

- کودک زیر ۳ ماه با تب بالای ۳۸ درجه
- استفراغی که متوقف نشود.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingcosult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱

در صورت وجود شرایط زیر معمولاً جراحی
فوری انجام نمی شود.

اختلالات انعقادی و خونریزی
داشتن شرایطی مثل عفونت و پارگی
آپاندیس

در زنان بارداری که نزدیک زایمان هستند.

مراقبت ها:

از دادن آسپرین به هنگام درد خودداری
نمایید. آنتی بیوتیک تجویز شده توسط
پزشک را به صورت دوره کامل مصرف کنید.

در مورد محدودیت غذایی از پرستار خود
سوال پرسید.

پس از بهبودی فعالیت به حالت قبل برمی
گردد.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماسست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



آپاندیس یک زائده انگشت مانند است که به روده بزرگ متصل است.

آپاندیسیت به التهاب آپاندیس گفته می شود. پاره شدن آپاندیس خطرناک است و باعث عفونت شکم می شود.

عوامل زمینه ساز:

- تجمع مدفوع در روده بزرگ
- بزرگی غدد لنفاوی به دلیل تحریک سیستم ایمنی
- ضربه
- گاهی اوقات عوامل شناخته شده نیست.

افزایش بروز ابتلا:

بیشتر در سنین ۱۰ تا ۳۰ سال بروز می یابد.

علائم:

- درد دور ناف و قسمت تحتانی راست شکم
- با سرفه و حرکات بدتر می شود.
- درد شدید در اثر لمس در ناحیه راست و تحتانی شکم
- تهوع و استفراغ
- کاهش اشتها
- تب
- یبوست
- اسهال



تشخیص:

- معاینه
- آزمایش خون
- آزمایش ادرار
- سونوگرافی، MRI، سی تی اسکن

درمان:

جراحی و خارج کردن آپاندیس
به دو صورت جراحی باز شکمی
جراحی لاپاروسکوپیک: از طریق دوربین و
چند سوراخ روی شکم انجام می شود.
در التهاب کم حتی ممکن است نیاز به
جراحی نباشد.
آنتی بیوتیک و مایعات وریدی نیز تجویز

