




شماره سند: AH-Edu-PA-24-01  
تاریخ تدوین: ۹۸/۱/۲۰  
تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰  
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

# انواژیناسیون



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

کودک بعد از درمان باید چند روز در بیمارستان بماند تا از بازگشت نکردن آن اطمینان پیدا کنیم و حرکات روده و رژیم غذایی نرمال داشته باشد.

## توصیه های پس از ترخیص:

دو روز بعد از عمل جراحی می توانید کودک خود به حمام ببرید.  
از کادر درمان جهت سطح فعالیت فرزندتان پس از ترخیص سوال کنید.  
به علائم بازگشت انواژیناسیون توجه داشته باشید.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

با ارزیابی سلامتی برای کودک دلبند شما



منبع: [www.nursingcosult.com](http://www.nursingcosult.com)

[www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)

اُدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۳۱



## درمان:

هدف اصلی درمان جلوگیری از پاره شدن و عفونت کامل شکم می باشد.

درمان در بیمارستان انجام می شود و شامل:

- برقراری ورید محیطی
- انجام بارییم انما جهت شست و شوی روده ها و انجام عکس و سونوگرافی
- انجان بارییم هوا: یعنی فرستادن هوا با فشار به درون روده جهت باز شدن درهم رفتگی روده ها
- ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد در صورتی که عفونت شکم داشته باشد یا درمان انما کارساز نباشد، قسمتی از روده از بین رفته باشد و نیاز به خارج سازی آن باشد یا انواژیناسیون بعد از انما نیز دوباره ایجاد شود.



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



### تعریف:

انواژیناسیون یک انسداد نسبی در روده می باشد. زمانی که یک قسمت از روده وارد بخش دیگر آن می شود.

### علائم:

- درد شدید شکمی
- شکم بزرگ شده و سفت
- استفراغ
- بی قراری یا خواب آلودگی
- مدفوع خونی
- تب
- گریه

• شیر نخوردن

• زانو های خود را به قفسه سینه فشار می آورد.

• پوست رنگ پریده

• تعریق

### عوامل افزایش ریسک ابتلا:

- پسر بچه ها
- کودکان کمتر از ۳ سال
- کودکان با عفونت های ویروسی
- کودکانی با تومور یا کیست یا پولیپ، رگه های خونی بدشکل
- کودکانی که اخیرا عمل جراحی شکم انجام دادند.
- ممکن است بعد از دریافت واکسن روتا ویروس هم دیده شود.



### عوامل:

در بیشتر مواقع دلیل آن التهاب و تورم غدد لنفی است. اما گاهی ممکن است آپاندیس یا تومور های روده باعث ایجاد آن شوند.

انواژیناسیون عمده ترین علت انسداد روده در کودکان ۳ ماهه تا ۳ ساله می باشد. اما بیشتر در ۱ سالگی رخ می دهد. میزان بروز آن در پسر ها بیشتر از دختر ها می باشد.

هم در کودکان و هم در بزرگسالان رخ می دهد.

### تشخیص:

براساس علائم کودک و معاینه و همچنین استفاده از سونوگرافی یا عکس شکم

