




شماره سند: AH-Edu-PA-44-01
تاریخ تدوین: ۹۸/۱/۱۹
تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فتق کشاله ران



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

• در صورت تجویز داروی آنتی بیوتیک آن را در

زمان مشخص و به طور کامل مصرف کنید.

• آغوش گرفتن کودک پس از جراحی طوری که

ناحیه عمل تحت فشار نباشد، مانعی ندارد.

• در بیماران پسر بعد از عمل ناحیه بیضه ها کمی

متورم می شود که طبیعی است.

• از انجام بازی های سنگین مانند پریدن، دویدن،

شنا کردن توسط کودک اجتناب شود.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱



مراقبت های بعد از عمل:

• ۲-۳ روز بعد عمل، محل جراحی با

پانسمان پوشیده باشد. مراقب باشد که

پوشک کودک با ناحیه عمل تماس نداشته

باشد.

• در صورتی که کودک درد داشته باشد می

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده و اعضاء شکمی به این دیواره ضعیف شده فشار آورده و یک کیسه بادکنک مانند درست می کند.



عوامل افزایش ابتلا فتق ران و کشاله ران:

- پسر بچه ها
- نوزادان نارس
- کودکان نژاد آفریقایی و آمریکایی
- کودکان با بیماری سیستمیک فیبروزیس (بیماری ارثی در مخاط که باعث می شود ترشحات بدن غلیظ و چسبنده باشد).

علائم:

در علائم باید به اینکه آیا با گریه یا سرفه فتق بزرگتر می شود یا نه و اینکه حرکات روده ای دارد توجه شود.

در صورتی که برآمدگی در بیضه ها یا ناحیه اتصال ران به شکم باشد فتق کشاله ران و اگر روی عضله ران باشد فتق رانی می باشد.

هرنی با فشار به عقب بر می گردد و با درد همراه است ممکن است تهوع و استفراغ نیز داشته باشد.



تشخیص:

با معاینه فیزیکی امکان پذیر است.

درمان:

اغلب جراحی می باشد.

مراقبت در منزل:

- به هیچ عنوان فتق را به داخل فشار ندهید.
- در صورت تغییر رنگ یا سایز یا درد ناحیه به پزشک اطلاع دهید.
- در صورت علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه نمایید:
- سرفه خلط دار و مکرر
 - بی قراری
 - نخوردن غذا
 - تب
 - درد در ناحیه
 - استفراغ
 - بیرون زدگی فتق با سرفه و گریه
- در مواقع اورژانس با ۱۱۵ تماس بگیرید.