



شماره سند: AH-Edu-PA-42-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کیست هیداتیک



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر به مراکز درمانی مراجعه

نمایید:

- ۱- بروز تنگی نفس و سیاه شدن با سرفه های خلط دار و شدید
- ۲- تب بالا و ضعف و بی حالی
- ۳- کهیر و واکنش های شدید حساسیتی



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

ادرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه- بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۳۱



پیشگیری:

از بین بردن سگ های ولگرد
تهیه شناسنامه بهداشتی برای سگ های صاحب دار روی قلاده
درمان سگ های گله و خانگی
کشتار دام ها در کشتارگاه های بهداشتی
اجتناب از تماس مستقیم با سگ
حصار کشیدن دور باغچه و سبزی کاری ها جهت جلوگیری از ورود سگ ها
شست و شو صحیح سبزیجات و میوه های بوته ای

درمان:

جراحی و خارج کردن کیست ها
داروی آلبندازول (قبل و بعد از عمل)
مراقبت بعد از عمل:

بسته به محل جراحی متفاوت است در صورت کیست ریه ممکن است لوله و محفظه ای جهت خروج ترشحات قرار دهند که مراقبت از پانسمان ناحیه و لوله و جلوگیری از پیچ و تاب خوردگی آن لازم است.
در صورت کیست کبد ممکن است درن (لوله باریک) از طریق شکم برای خروج ترشحات استفاده شود.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

بیماری کیست هیداتیک توسط یک انگل ایجاد می شود. این کرم در روده سگ وجود دارد تخم های کرم توسط مدفوع سگ به محیط انتشار می یابد و انسان با خوردن سبزیجات آلوده به تخم مبتلا شده و در بدن بیمار به شکل کیسه ای در می آید که به آن کیست هیداتیک می گویند. کیست هیداتیک از قدیمی ترین بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوانات است. تا کنون درمان دارویی قاطع بر علیه بیماری پیدا نشده و تنها راه درمان قاطع عمل جراحی و برداشت کیست می باشد.

چرخه زندگی کیست هیداتیک:

چرخه زندگی این انگل بین سگ سانان و گیاهان تکمیل می شود و در صورتی که انسان گیاهان آلوده به تخم را مصرف نماید به بیماری مبتلا می شود و اگر حیواناتی مثل گاو و گوسفند سبزیجات آلوده به کرم را مصرف کند در کبد و احشاء این حیوانات کیست تشکیل شده و اگر توسط سگ سانان خورده شود دوباره چرخه تکرار می شود.

راه انتقال بیماری به انسان:

- ۱- تماس نزدیک و مستقیم با سگ هایی آلوده
- ۲- تماس مستقیم با مدفوع سگ آلوده
- ۳- مصرف آب، غذا و سبزیجات آلوده با مدفوع سگ



علائم بیماری کیست هیداتیک:

علائم بستگی به محل کیست (کبد، ریه، مغز، استخوان)، بزرگی کیست و موقعیت کیست دارد.

پس از بلع تخم هر اندامی از بدن می تواند محل بوجود آمدن کیست باشد و بسته به این که در چه اندامی کیست ایجاد شده اختلال در عملکرد همان عضو را داریم.

کیست های ریوی و کبدی شایع تر هستند.

بعضی از علائم شامل:

- درد شکمی
- تنگی نفس
- سرفه خشک یا همراه خلط خونی
- عفونت های ثانویه به علت پاره شدن کیست
- در صورت بروز در کبد منجر به از کار افتادگی کبد یا حتی در صورت درمان نشدن منجر به مرگ می شود.