



شماره سند: AH-Edu-PA-17-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بلع جسم خارجی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت بروز علائم زیر حتما به پزشک مراجعه نمایید:

- تنفس با صدای خس خس یا تنفس مشکل
- درد در قفسه سینه و سرفه
- عدم توانایی در خوردن و آشامیدن
- بزاق دهان به میزان زیاد
- مدفوع خونی
- خفگی
- پوست به رنگ آبی
- کودک زیر ۳ ماه با تب بالای ۳۸ درجه
- بلع باتری حتی بدون علامت



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه — بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱

تشخیص:

- عکس ساده
- آندوسکوپی تحت بیهوشی عمومی
- گاهی نیاز به عکس رنگی با ماده حاجب یا سونوگرافی نیز خواهد بود.
- سی تی اسکن

درمان:

تحت آندوسکوپی جسم بیرون آورده می شود.

موارد اورژانس درمان:

- زمانی که جسم به درون ریه نیز وارد شده است.
- قسمتی از راه هوایی را مسدود کرده باشد.
- به لوله گوارشی آسیب زده باشد
- جسم تیز و برنده و باتری، آهنربا و داروها
- در مورد بلع باتری ضروری است کودک خود را هرچه سریع تر (کمتر از ۴ ساعت از زمان بلع) به اورژانس بیاورید.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

بلع جسم خارجی به رفتن جسم خارجی به داخل مری یا سایر قسمت های دستگاه گوارش می گویند که در کودکان ممکن است به صورت تصادفی یا عمدی رخ بدهد.

در این مواقع کودک باید استراحت کند و چیزی نخورد. اگر جسم کوچک باشد دفع می شود در غیر این صورت باید خارج شود.



موارد اورژانس شامل:

- زمانی که جسم در گلو گیر کرده است
- جسم تیز و برنده
- مواد سمی مثل باتری و آهنربا
- جسم سیستم تنفسی را هم درگیر کرده است
- کودک قادر به بلع نباشد.

رایج ترین اجسام مورد بلع:

- سکه
- سنجاق
- پیچ
- باتری
- قطعات اسباب بازی
- تکه های غذا



بیشترین شرایطی که اتفاق می افتد:

- ۱- کودکان بین ۶ماه تا ۶سال
 - ۲- در پسر بچه ها
 - ۳- عقب مانده ذهنی
 - ۴- مشکل غیر طبیعی در ساختار دستگاه گوارش
- ### علائم و نشانه های گیر کردن جسم خارجی:

- عدم توانایی بلع غذا یا مایعات
- افزایش بزاق دهان
- بی قراری
- احساس خفگی
- صدای خشن
- تنفس مشکل
- تب
- کاهش وزن یا کاهش اشتها
- استفراغ خونی

پیشگیری:

- غذاهای کودک را با تکه های کوچک آماده کنید.
- استخوان و دانه های غذا را از آن خارج کنید.
- جلوگیری از مصرف شکلات های سخت و ذرت و آجیل
- غذاهای درشت توسط کودک
- به کودک آموزش دهید که غذا ها را خوب بجود.
- به او یاد دهید در هنگام غذا خوردن صحبت نکند.
- به هنگام خوردن و نوشیدن حتما بنشیند.
- اجسام خطرناک و باتری ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.