



شماره سند - AH-Edu-pa-100-01

تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۳/۱۰

تاریخ بازنگری: ۰۲/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسمومیت با استامینوفن



مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی بیمارستان اکبر مشهد
واحد آموزش به بیمار

- 4- هرگز از شیشه داروهای دیگر برای نگه داری از سایر داروها استفاده نشود.
- 5- از مصرف خودسرانه استامینوفن بدون نظر پزشک اجتناب کنید.
- 6- دوز دارو در کودکان حتما با صلاحدید و طبق نظر پزشک مصرف شود.

داروهای همچون فنی تونین یا کاربامازپین ، زمانی که با استامینوفن استفاده شود احتمال آسیب کبدی ناشی از استامینوفن را افزایش داده و اثر دارویی استامینوفن را کم می کند.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.medlineplus.gov و www.uptodate.com

آدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه - بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۳۱۸۹۱ داخلی ۱۲۱

دارو های مصرفی

شروع پاد زهر استامینوفن به نام ان استیل سیستین در بیمارستان طبق دستور پزشک متخصص و پس از آماده شدن آزمایشات بیمار طبق صلاحدید انجام می شود که در طی 21 ساعت با دوز های متفاوت انفوزیون میگردد.

درمان تزریقی این دارو به نوع خوراکی به علل زیر ارجحیت دارد:

- 1- عدم تحمل خوراکی
- 2- درمان نسبتا دیر آغاز شده باشد.
- 3- بروز علائم انسفالوپاتی

فعالیت مجاز و غیر مجاز

در صورتی که بیمار کاهش سطح هوشیاری و تهوع و استفراغ نداشته باشد منع فعالیتی ندارد.

رژیم غذایی مجاز و غیر مجاز

در صورت تهوع و استفراغ، بیمار ناشتا نگه داشته می شود و اگر بیمار تهوع و استفراغ نداشت، رژیم غذایی معمولی است.

آموزش های خود مراقبتی

- 1- داروهای خوراکی دور از دسترس افراد باشد.
- 2- استامینوفن را نباید بیش از 5 روز بدون تجویز پزشک مصرف کرد.
- 3- در صورت برگشت حالت تهوع به مرکز درمانی مراجعه شود.

با آرزوی سلامتی برای شما

مطالب فوق به منظور آشنایی با مسمومیت با استامینوفن و مراقبت های لازم بعد از آن تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



مسمومیت با استامینوفن

استامینوفن (ان استیل پی آمینوفنول یا پاراستامول)، دارویی است ضد درد و ضد تب که خاصیت ضد التهاب و ضد پلاکت محیطی ضعیفی دارد و به صورت قرص، شربت، قطره و شیاف موجود است. استامینوفن از داروهای پرمصرفی است که با اثر بر مرکز تب در مغز باعث کاهش تب می شود و از طرفی این دارو باعث کاهش احساس درد نیز می شود. این دارو اثراتی مشابه با آسپرین دارد با این تفاوت که اثر ضد التهابی ندارد، لذا در بیماریهای التهابی همچون روماتیسم قلبی استفاده نمیشود.



علائم مسمومیت با استامینوفن

شروع نشانه ها ممکن است از چند ساعت تا چند روز به طول بیانجامد. علائم شامل: ایجاد تهوع و استفراغ، سردرد، سرگیجه، درد شکمی، کاهش اشتها، تعریق بدون علت، بزرگی کبد، زردی پوست، تشنج و کما می باشد.



روش های تشخیصی

- 1-گرفتن شرح حال و تاریخچه از بیمار اندازه گیری سطح استامینوفن سرم که از طریق ارسال، نمونه خون بیمار بعد از گذشت 4 ساعت از مصرف دارو امکان پذیر می باشد.
- 2-انجام تست های عملکرد کبدی و آزمایشات روتین
- 3-مراقبت و مانیتورینگ نبض و فشارخون بیمار

درمان

در صورت شك به مسمومیت با استامینوفن باید بیمار را به اولین اورژانس در دسترس و ترجیحاً دارای بخش مسمومین رساند. در صورت امکان تا قبل از رسیدن به اورژانس، اگر فرد هوشیار است 1-در اورژانس مسمومین پس از گرفتن شرح حال از بیمار و خانواده، باز بودن راه های هوایی، وضعیت تنفس و وضعیت قلبی عروقی فرد و نیز قند بیمار کنترل می گردد.

2-در صورتی که بیمار در یک ساعت اول پس از مصرف مراجعه کرده و دوز بالایی از دارو مصرف شده باشد اگر ممنوعیتی وجود نداشته باشد شست وشوی معده انجام می شود.

3-در شش ساعت اول بعد از مصرف در صورتی بیمار، دوز بالایی از دارو مصرف کرده است، اگر ممنوعیتی وجود نداشته باشد تجویز ذغال فعال انجام می گردد.

4-در صورتی که بیمار حداقل نصف دوز سمی را به صورت حاد مصرف کرده باشد، حتماً تست سطح سرمی استامینوفن بایستی انجام می گردد. 5-توجه کنید که سطح سرمی استامینوفن باید در فاصله 4-24 ساعت بعد از مصرف اندازه گیری شود آزمایش های کبدی و کلیوی نیز با صلاحدید پزشک انجام میشود.

