



شماره سند: AH-Edu-PA-97-01

تاریخ تدوین: ۹۹/۴/۲

تاریخ بازنگری: ۰۲/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۴/۰۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

# عقرب گزیدگی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

ولعد آموزش به بیمار

- 8- به کودکان و نوجوانان آموزش دهید هرگز دست یا پای خود را درون حفره ای که نمی بیند وارد نکند
- 9- در علفزارها حتما با چکمه های بلند حرکت کنید.

## اقدامات بعد از ترخیص :

درطول چند روز آینده پس از ترخیص ممکن است دچار احساس ضعف، بی حالی، بی اشتها، علائمی شبیه سرماخوردگی داشته باشید که نیاز به استراحت کافی خواهید داشت

بالانگه داشتن اندام جهت کاهش تورم خودداری از خواریدن محل ضایعه، زیرا خارش باعث زخمی شدن و بروز عفونت شدید پوستی می شود.

ممکن است تا چند هفته محل گزش دچار درد باشد که می توانید با دستور پزشک از مسکن های ساده استفاده کنید.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

ادرس: رضا شهر - بلوار شهید کاوه - روبروی شهید کاوه ۱

کتاب مسمومین خانم دکتر آناهیتا علیزاده

[Www.nlm.nih.gov/medlinplus](http://Www.nlm.nih.gov/medlinplus).

## اقدامات جهت جلوگیری از عقرب

### گزیدگی :

- در هنگام رفتن به جای کویری و گرم :
- 1- لباسهای خود را قبل از پوشیدن حتما بتکانید.
- 2- کفشها را درون چادر یا محل خوابتان بگذارید و قبل از پوشیدن کفشها آنها را بتکانید.
- 3- اگر عقربی را روی بدن خود حس کردید فوراً آن را از روی بدن خود پرت کنید.
- 4- نصب توری در پنجره ها
- 5- پوشاندن فاصل درب و کف زمین و درز دیوارها
- 6- جلوگیری از تلمبار کردن نخاله های ساختمانی
- 7- در فضای باز استراحت نکنید یا از توری یا پشه بند استفاده کنید



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



عقرب ها چگونه موهوداتی هستند؟



عقرب ها بندپایان بی مهره هستند که نیش آنها در انتهای دم دمشان قرار دارد. عقرب گزیدگی بسیار دردناک بوده و می تواند مخصوصا برای بچه ها و سالمندان کشنده باشد.

### علائم عقرب گزیدگی :

1- احساس درد و سوزش در ناحیه نیش زده

2- کمرختی گسترده بدن

### 3- مشکل در بلع

### 4- بند آمدن زبان

### 5- تاری دید و تنگی نفس

### 6- افزایش ترشح بزاق

### 7- شوک

### 8- اختلالات قلبی

### 9- اختلالات خونریزی دهنده

### 10- اختلالات کلیوی



### اقدامات اولیه :

1- محل عقرب گزیدگی را با آب و صابون بشویید .

2- خارج کردن زیور آلات، زیرا تورم بافت آسیب دیده ممکن گردش خون را دچار مشکل کند .

3- قراردادن اندام هم سطح قلب

4- فرد مصدوم را به آرامش تشویق نموده و از حرکت کردن وی جلوگیری نمایید .

5- زیرا حرکت باعث تسریع جریان خون و پخش سم در بدن می شود.

6- عضو گزیده شده اگر دست یا پا است، در سطح قلب قرار بگیرد.

7- از مکیدن محل گزش اجتناب شود زیرا باعث آلودگی محل گزش می شود .

8- از بستن پایین و بالای محل گزش خودداری شود.

### اقدامات بالینی :

تزریق سرم ضد عقرب (در صورت صلاحدید)

گرفتن آزمایش خون و ادرار

اندازه گیری پیشرفت محل گزش توسط پزشک

در صورت لزوم تجویز داروهای مربوطه از جمله مسکن و سایر داروها

