



شماره سند: AH-Edu-pa-104-01
تاریخ تدوین: ۱۳۹۹/۳/۱۰
تاریخ بازنگری: ۰۴/۱/۲۰
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسمومیت با سموم ارگانوفسفره ها



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر
واحد آموزش به بیمار

آموزش های زمان ترخیص:

- علایم: آبریزش بینی
- تنگی نفس
- ضعف شدید عضلانی
- حرکات غیرعادی زبان
- احساس ناتوانی در حرکات اندام
- اختلال هوشیاری
- دل درد و تهوع استفراغ و اسهال مراجعه به مرکز درمانی شود
- ۴۸ ساعت بعد از ترخیص مراجعه به پزشک.



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به



منبع: کتاب مسمومیت کودکان: خانم دکتر آناهیتا علیزاده
www.medlineplus.gov
آدرس: بلوار شهید کاوه—کاو ۱۴
تلفن: ۳۱۸۹۱
داخلی ۱۲۱

نکات مورد توجه:

- ۱- برچسب روی ظروف سموم دفع آفات و بروشور آن را ابتدا کاملاً مطالعه کنید و سپس جهت استفاده دقیقاً مطابق دستور عمل نمایید
- ۲- هرگز سموم دفع آفات را در ظروف مشابه مواد خوراکی و آشامیدنی نگهداری نکنید
- ۳- در هنگام سم پاشی مزارع، باغات، باغچه ها حتماً از ماسک و دستکش و لباس مناسب استفاده نمایید و از مخلوط کردن سموم مختلف باهم اجتناب کنید، و سموم را از جاهای معتبر با بروشور تهیه شود.



با آرزوی سلامتی برای شما

مطالب فوق به منظور آشنایی با مسمومیت با سموم و مراقبت های لازم بعد از آن تهیه شده است. امید است با مطالعه مطالب قادر باشید دوره درمان خود را به خوبی مدیریت نمایید.



تعریف

سموم : به حشره کش ها و آفت کش هایی گفته می شود که بیشتر در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

علل مسمومیت : انسان ممکن است به علل زیر با سموم مذکور به طور مصرف عمدی یا اتفاقی دچار مسمومیت گردد یا به صورت تماس با حشره کش های مورد مصرف در کشاورزی - مصرف میوه های آلوده و استنشاق سم

علائم :

- افزایش بزاق و ترشحات زیاد
- آبریزش بینی
- تنگی مردمک
- کاهش ضربان قلب - افزایش فشارخون
- تکرر بی اختیاری ادرار
- لرزش
- اسهال و استفراغ
- تشنج
- کما
- شوک



اقدامات اولیه :

- از خوردن و آشامیدن اجتناب شود .
- در صورتی که بدن با پوست بیمار با سم آغشته شده شستشو با آب و صابون و همه لباس های آلوده را از محیط و بیمار دور کنید در اولین فرصت به نزدیک ترین مرکز درمانی مراجعه کنید .
- در صورتی که بیمار در یک ساعت اول بعد از مصرف مراجعه کرده شستشوی معده از اهمیت بالایی برخوردار است.
- تهویه محل بستری کاملاً مناسب باشد .
- انجام آزمایشات معمول طبق نظر پزشک
- جهت جلوگیری از ورود ترشحات معده به ریه ، به پهلوی چپ خوابانده ، سر به پایین خم شود .
- هرگز در مسمومیت بدون احتیاط به بیمار/ مددجو شیر یا چربی داده نشود زیرا این امر می تواند منجر به تشدید مسمومیت شود .
- اگر سم داخل چشم ها پاشیده شد به مدت ۱۰ دقیقه با آب و یا سرم شستشو شسته شود .