



شماره سند: AH-Edu-PA-18-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۱۸

تاریخ بازنگری: ۰۲/۴/۲۰

آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بلع مواد سوزاننده در کودکان



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

• حتما این مواد را در کمد درب دار و دارای قفل نگهداری شوند.

• در هنگام استفاده از مواد شوینده، در صورتی که مقداری از آن در پایان کار باقی ماند حتما دور ریخته شود.

• مواد سوزاننده را در داخل ظروف غیرمرتبط مانند بطری نوشابه، دلستر، آب معدنی و..... نگهداری نکنید.

• خودداری از بازی کردن کودکان در مکانی دور از دید والدین

• با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingcosult.com

www.uptodate.com

اُدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۳۱



اقدامات لازم در مراکز درمانی:

- ناشتا کردن و سرم درمانی کودک
- انجام آندوسکوپی
- دارو درمانی با توجه به وضعیت کودک



نکته:

- موادسوزاننده(آب باطری ، سفیدکننده ظروف ، تمیز کننده سطوح ، لوله باز کن و.....) را از دسترس کودکان دور نگه داریدو داخل کابینت زیر سینک یا موارد مشابه قرار ندهید.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



خوردن مواد سوزاننده اسیدی یا قلیایی در کودکان ۱ تا ۵ سال شایع تر است.

محلول های لوله بازکن، آب باطری، ضد عفونی کننده، مایعات سفیدکننده، شوینده ها، جوهرنمک و... جزء مواد سوزاننده ای هستند که به طور نسبتا شایع در کودکان باعث سوختگی دستگاه گوارش (مری، معده و...) می شوند.

علائم:

- آبریزش دهان
- بی قراری
- بلع مشکل
- استفراغ خونی یا غیر خونی
- درد شکم
- سوختگی دهان و لب
- تنگی نفس

نکته:

ممکن است زخم و قرمزی در اطراف لبها یا داخل دهان کودک دیده نشود، اما همزمان سوختگی شدیدی در قسمتهای داخلی دستگاه گوارش (مری، معده) وجود داشته باشد بنابراین هر چه سریعتر کودک را نزد پزشک ببرید.



اقدامات لازم توسط والدین:

- شستن اطراف دهان و پوست آن محل با آب فراوان
- انتقال هر چه سریعتر کودک به مراکز درمانی
- خودداری از وادار کردن کودک به استفراغ
- خودداری از خوردن و آشامیدن
- خودداری از مصرف مواد خنثی کننده
- همراه داشتن ظرف حاوی موادی که کودک خورده است جهت کمک به پزشک برای تصمیم گیری بهتر
- در ساعت اول بلع مواد سوزاننده می توان در صورت عدم وجود تهوع و استفراغ مقدار کمی شیر یا آب به بیمار خوراند.

