



شماره سند: AH-Edu-PA-16-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۳/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آندوسکوپی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

• تغییر دمای بدن

• بلع مشکل

• احساس صدای خش خش زیر پوست گردن

آموزش به والدین بعد از انجام آندوسکوپی:

* تا زمانی که کودک کاملاً هوشیار نشده نباید از طریق دهان چیزی بخورد. و بعد از هوشیاری کامل ابتدا مایعات و سپس از هر ماده غذایی می تواند استفاده کند.

بعد آندوسکوپی اکثر بیماران احساس خوبی دارند اما گاهی ممکن است احساس خستگی داشته باشند که توصیه می شود استراحت کنند.

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۲۱

و حدوداً ۱۰-۲۰ دقیقه زمان می برد. معمولاً نمونه بیوپسی از قسمت های مختلف میگیرند و جهت بررسی به آزمایشگاه می فرستند.

عوارض:

- آسیب به مایع پس از آندوسکوپی به درون ریه
- عارضه داروی بیهوشی (قبل از آندوسکوپی در صورت حساسیت به این نوع از دارو ها اطلاع بدهید).
- خونریزی از ناحیه بیوپسی (نمونه برداری)
- پارگی در لوله گوارشی حین آندوسکوپی



در صورت این علائم به پزشک یا پرستار

اطلاع دهید.

- درد شدید شکمی
- نفخ شدید شکم
- استفراغ

والدین گرامی:


این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

آندوسکوپي این امکان را فراهم می آورد که پزشک به صورت مستقیم قسمت فوقانی دستگاه گوارش شامل مری، معده، و قسمتی از روده باریک را مشاهده کند.

پزشک التهاب و قرمزی، زخم یا تومور را بررسی می کند.



دلایل آندوسکوپي :

- درد در ناحیه فوقانی شکم
- بازگشت اسید معده به مری
- تهوع و استفراغ مداوم
- خونریزی گوارشی (استفراغ خونی یا مدفوع خونی مثل قیر)
- در حین آندوسکوپي خونریزی گوارشی مورد درمان قرار می گیرد.



- بلع مشکل
- بلع ماده خارجی
- بررسی تومور و زخم یا پولیپ

- بلع مواد سوزاننده

آمادگی های قبل از آندوسکوپي:

الف- قبل از انجام آندوسکوپي موارد زیر را به پزشک اطلاع دهید :

- اگر کودکان داروی خاصی مصرف می کند.

- اگر کودکان به داروی خاصی مثل

داروهای بیهوشی حساسیت دارد.

- اگر کودکان مشکل انعقادی دارد یا داروهای رقیق کننده خون مثل هپارین یا داروهای حاوی آسپرین دریافت میکنند.

- اگر کودکان بیماری قلبی دارد.

- اگر کودکان علائم سرماخوردگی (سرفه، عطسه و یا تب) دارد.

ب - ۶ ساعت قبل از آندوسکوپي باید کودکان ناشتا باشد.

اقدامات حین آندوسکوپي:

داروی آرامبخش تزریق می شود تا کودک در

موقع انجام آندوسکوپي آرام باشد.

در حین آندوسکوپي، علائم حیاتی مثل ضربان قلب، فشار خون و سطح اکسیژن بررسی می شود.

و جهت باز شدن معده مقداری گاز اکسیژن را وارد معده می کنند. تا بهتر دیده شود.