



شماره سند: AH-Edu-PA-74-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کاواساکی



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

در صورت مشاهده علائم زیر به مراکز درمانی

مراجعه کنید:

- تب مجدد
- عدم بهبود علائم یا برگشت علائم
- تنفس سطحی یا نامنظم
- افزایش تورم پاها و دست ها و مفاصل
- خونریزی از هر ناحیه بدن

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰۰ دافلی ۱۳۱

مراقبت در منزل:

- مصرف دارو ها طبق تجویز پزشک باشد.
- دریافت ایمونوگلوبولین داخل وریدی حتما باید در بیمارستان و تحت نظر پزشک و دقیق باشد.
- آسپرین در خانه حتما با نظر پزشک معالج ادامه یابد
- درد و تورم مفاصل تا چند پس از نقاهت ادامه می یابد.
- از تزریق واکسن ویروس زنده ضعیف شده (MMR) تا ۱۱ ماه پس از دریافت ایمونوگلوبولین وریدی ممنوع است.
- در صورت تب بالای ۳۸ درجه سانتی گراد و برگشت علائم در منزل به پزشک معالج اطلاع دهید .
- اکوی قلب و آزمایشات در فواصل منظم و دوره ای بسته به شرایط کودک شما تکرار می گردد.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

کاواساکی شرایطی است که در آن دیواره عروق خونی دچار تورم و التهاب شده است. و همچنین دارای اثراتی روی مخاط، غدد لنفاوی، پوست اندام ها و قلب می باشد. درمان زود هنگام بیماری عوارض آن را کاهش می دهد.

علت:

ناشناخته است اما گاهی ابتلا به عفونت ها یا مشکل در سیستم ایمنی بدن منجر به ایجاد بیماری می شود.

در افراد زیر بیشتر دیده می شود:

- کودکان زیر ۵ سال
- نژاد آسیایی
- پسران

علائم:

- تب مداوم بالای ۳۹ درجه سانتی گراد که به آنتی بیوتیک و تب برها جواب نداده و بیش از ۵ روز طول بکشد.
- قرمزی شدید در چشم ها بدون ترشح چرکی
- لب های خشک و ترک خورده
- ادم پست دست ها
- قرمزی کف دست ها و پاها
- التهاب و قرمزی حلق
- زبان متورم و قرمز شبیه توت فرنگی
- راش های پوستی شبیه سرخک
- تورم غدد لنفاوی (معمولا در یک طرف گردن)
- سایر نشانه هایی که ممکن است وجود داشته باشد:
- تورم دردناک مفصل
- تهوع و استفراغ، اسهال
- درد شکم
- پوسته ریزی انتهای دستها یا پاها بعد از هفته اول



تشخیص:

آزمایشات خون
عکس رادیوگرافی
نوار قلب و اکوی قلبی
آزمایش ادرار

درمان:

- بستری در بیمارستان و تزریق ایمونوگلوبولین داخل وریدی (IVIG)
- آسپرین
- کورتون ها
- داروهای مخصوص ضد انعقاد خون با نظر پزشک معالج
- در صورت آسیب قلبی ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد.

