



شماره سند: AH-Edu-PA-80-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۱/۲۰


تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اختلال مادرزادی غده فوق کلیه



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

احتیاطات:

بهتر است فرزند شما دستبند یا گردنبند همراه خود داشته باشد که بروی آن قید شده است مبتلا به نارسایی آدرنال است. با این کار در شرایط حاد پزشک اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در صورت تب، عفونت یا هرگونه استرس شدید (تصادف و...) نیاز است دوز دارو افزایش یابد تا از ایجاد افت قند خون و شوک (بحران آدرنال) جلوگیری شود.

- در صورت تب بیشتر از ۳۸ درجه دوز دارو (هیدروکورتیزون) را ۲ برابر کنید.
- در صورت تب ۳۹ درجه دوز دارو (هیدروکورتیزون) را ۳ برابر کنید.

در صورت عدم تحمل دارو، استفراغ، بی حالی هرچه سریع تر به پزشک مراجعه نمایید.

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingcosult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه - بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۳۱



پیشگیری:

در صورت سابقه فرزند مبتلا با آزمایش ژنتیک در سه ماهه اول یا دوم بارداری از جنین می توان از تولد جنین مبتلا پیشگیری کرد.

در صورت سابقه فرزند مبتلا می توان با مصرف دارو توسط مصرف دارو توسط مادر در بارداری از ایجاد ناهنجاری دستگاه تناسلی در جنین مبتلا جلوگیری کرد ولی نوزاد متولد شده سالم نخواهد بود و نیاز به درمان مادام العمر خواهد داشت.

درمان:

جایگزینی هورمون های فوق کلیه

در صورت نیاز جراحی بازسازی دستگاه تناسلی



والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

CAH یک نوع اختلالی است که بر روی غده فوق کلیه اثر می گذارد.

قشر غده فوق کلیه ۳ نوع هورمون تولید می کند، هورمون کورتیزول، آلدوسترون و هورمون های جنسی که در افراد با این بیماری موارد زیر رخ می دهد :

۱- کاهش کورتیزول (تنظیم قند و انرژی و مواقع استرس ترشح می شود).

۲- کاهش آلدوسترون (تنظیم نمک و مایعات بدن)

۳- افزایش هورمون جنسی

تشخیص:

- براساس علائم بالینی (تیره شدن رنگ پوست، غیرعادی بودن ظاهر دستگاه تناسلی خارجی)
- آزمایشگاه (آزمایشات هورمونی ، نمک های خون، قندخون)
- تایید نهایی با تست ژنتیک

علائم در نوزادی:

- اختلال در شکل گیری دستگاه تناسلی خارجی در نوزاد مونث
- تیره شدن رنگ پوست
- بی حالی، استفراغ، خوب شیر نخوردن
- افت قندخون و اختلال در تنظیم نمک های خون

علائم در سنین بالا تر:

- ایجاد علائم مردانه در دختران مثل رشد موهای زائد، آکنه، خشن شدن صدا
- ایجاد علائم بلوغ زودرس در پسران مثل بزرگ شدن آلت تناسلی، افزایش سرعت رشد قد، خشن شدن صدا
- اختلال باروری در دختران
- کوتاه شدن قد نهایی در هردو جنس

