




شماره سند: AH-Edu-PA-95-01  
تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰  
تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰  
تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

## مننژیت

### (التهاب پرده های مغز)



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

### پیشگیری:

- شستن دست ها قبل و بعد از تعویض پوشک
- شستن دستها قبل از غذا
- آموزش به کودکان در سن مدرسه برای اینکه از لیوان و وسایل بهداشتی شخصی استفاده کنند.
- در هنگام سرفه کردن جلوی دهان خود را با دستمال بگیرید.
- با افرادی که علائم بیماری را دارند تماس نزدیک نداشته باشید و روبوسی نکنید.
- با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: [www.nursingconsult.com](http://www.nursingconsult.com)

[www.uptodate.com](http://www.uptodate.com)


آدرس بیمارستان: بلوار شهید کاوه—بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۸۰۰ دافلی ۱۲۱

### تشخیص:

- کشت خون
- گرفتن مایع مغز و نخاع از ناحیه ستون فقرات برای تشخیص نوع میکروب و تجویز داروی مناسب آن
- سی تی اسکن معمولاً قبل از ال پی و برای بررسی نومور و آسیب مغزی انجام می شود.

### درمان:



جمع کوری  
نمونه مایع  
مغزی نخاعی  
برای ارسال به  
آزمایشگاه



نوع باکتریایی:

آنتی بیوتیک و درمان های حمایتی مانند حفظ فشارخون، جلوگیری از خونریزی و کم آب شدن کودک آنتی بیوتیک بلافاصله بعد از آزمایش خون و گرفتن مایع نخاعی، از طریق عروقی تجویز می شود. در مننژیت به صورت خوراکی تجویز نمیشود.

مدت درمان آنتی بیوتیک در نوع باکتریایی حداقل ۱۰-۱۴

روز

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



### تعریف:

مننژ به پرده ای که روی مغز و نخاع کشیده شده است گفته می شود و به التهاب آن مننژیت می گویند.

مننژیت می تواند ناشی از عفونت باکتری یا ویروسی باشد.



### عوامل:

#### مننژیت باکتریایی:

به سن کودک و سابقه واکسیناسیون نیز باید توجه داشت.

- تماس با شخصی که بیماری مننژیت دارد.
  - عفونت اخیر (مثل عفونت گوش یا سینوس ها)
  - سفر به کشورهای که این بیماری در آنجا شایع است مثل آفریقا
  - ضربه شدید سر
  - مشکل در سیستم ایمنی
  - حلزون مصنوعی گوش
- مننژیت باکتریای یک اورژانس است و باید سریعاً درمان شود تا از عوارض آن یا حتی مرگ پیشگیری شود.

#### مننژیت ویروسی:

- بیشتر با تماس مستقیم مدفوع فرد بیمار به هنگام تعویض پوشک یا غیرمستقیم آب ، غذا ، سطح آلوده به مدفوع منتقل می شود
- سایر روش های انتقال: در طول تولد، پخش شدن ویروس در هوا، تماس مستقیم با فرد بیمار و از طریق حیوانات و حشرات

### علائم:

در نوع باکتریایی شدیدتر است.

**نوزادان:** تب، و علائم غیر اختصاصی مثل خوب شیرنخوردن، استفراغ، اسهال ودانه های پوستی، سفتی عضلات گردن، تورم ملاج، بی قراری یا بی حالی

**کودکان :** تب، سردرد، تهوع و استفراغ، گیجی، سفتی عضلات گردن، و ناراحتی با تابیدن نور در چشم ها

مننژیت همچنین ممکن است باعث تشنج و عدم هوشیاری شود.

نوعی خاصی از مننژیت باکتریایی با ضایعات پوستی همراه است.

در نوع ویروسی علائم شبیه آنفلوآنزا می باشد. مثل تب ، درد عضلات ، آبریزش از بینی، سرفه و نوعی خاصی از نوع ویروسی همراه ضایعات پوستی می باشد.

