



شماره سند: AH-Edu-PA-68-01

تاریخ تدوین: ۹۸/۲/۲۰

تاریخ بازنگری: ۰۴/۴/۲۰

تاریخ آخرین ویرایش: ۰۲/۴/۲۰



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آنژیوادم



دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان اکبر

واحد آموزش به بیمار

نکات مورد توجه:

در صورت مصرف داروهای ذکر شده بهتر است ابتدا هر ۶ ماه یکبار و سپس سالانه تست های زیر انجام شود:

- ۱-آزمایش ادرار
- ۲-بررسی سطح چربی خون
- ۳-آزمایش تست های کبدی
- ۴-آزمایش شمارش سلولی خون
- ۵-سونوگرافی از کبد
- ۶-معاینات سالانه ی چشم پزشکی

با آرزوی سلامتی برای کودک عزیزتان



اسکن کد با نرم افزار بارکدخوان جهت دسترسی به مطالب آموزشی



منبع: www.nursingconsult.com

www.uptodate.com

آدرس: بیمارستان: بلوار شهید کاوه- بیمارستان کودکان اکبر

تلفن: ۵-۳۸۷۱۳۱۰۰ دافلی ۱۳۱



کنترل علائم بیماری:

- کنترل دارویی در طولانی مدت: مصرف برخی از داروها مانند دانازول و ترانس آمیک اسید طبق دستور پزشک معالج
- پیشگیری دارویی کوتاه مدت: در صورت انجام اقدامات سنگین مانند لوله گذاری، جراحی، زایمان و بهتر است از داروی دانازول (۵-۱۰ روز قبل از اقدام تا ۲ روز پس از آن) و یا پلاسمای تازه منجمد (۶-۱ ساعت قبل از اقدام) طبق دستور پزشک استفاده شود.

درمان:

در صورتی که علائم بیماری شدید است حتما به بیمارستان مراجعه کنید. اگر علائم تنفسی وجود دارد باید ابتدا راه هوایی برقرار شود

داروهای مورد

استفاده شامل:

آنتی هیستامین

آپی نفرین

استروئیدها



معمولا علائم ظرف ۲۴-۴۸ ساعت بهبود می یابد.

والدین گرامی:

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شماست. امیدواریم با مطالعه این مطالب و رعایت نکات ذکر شده در آن، شاهد بهبودی سریعتر کودکان باشیم.



تعریف:

هرگونه تورم موضعی در پوست و مخاط و بافت‌های زیرجلدی که با یا بدون کهمیر باشد را آنژیو ادم گویند.

انواع آنژیو ادم:

۱- آنژیو ادم ارثی (کمبود وراثتی پروتئین)

۲- آنژیو ادم اکتسابی

۳- آنژیو ادم آلرژیک

۴- آنژیو ادم ناشی از مصرف برخی داروها

آنژیو ادم ارثی بصورت تورم بدون خارش و کهمیر بروز میکند و نواحی مختلفی از قبیل اندام ها، دور چشم ،

لبها، حنجره، جدار روده و ناحیه تناسلی را درگیر میکند که بعلت کاهش تولید فاکتور پروتئین می باشد.

عوامل تحریک کننده بروز حملات آنژیو ادم:

۱- استرس روحی و روانی

۲- تروما و ضربه

۳- ورزشهای برخوردی

۴- دندانپزشکی

۵- زایمان، جراحی، لوله گذاری

۶- خستگی

۷- مصرف الکل

۸- مصرف بعضی داروها (ضدبارداری و کاهنده

فشارخون)

تشخیص:

- شرح حال
- آزمایش خون
- تست های آلرژی پوستی



علائم:

- ۱-علائم درگیری شکم:دردهای مزمن و تیرکشنده،تهوع،استفراغ و اسهال طول کشیده
- ۲-علائم درگیری تنفسی:گرفتگی و تغییرات صدا،خرخر،تنگی نفس،احساس سنگینی در قفسه سینه،گرفتگی گلو و حلق،سختی در بلع
- ۳-تورم در صورت،زبان،اندام ها،تنه و دستگاه تناسلی

سابقه ی خانوادگی:

در صورت ابتلای یکی از اعضای درجه اول خانواده به آنژیو ادم ارثی و تایید تشخیص بیماری ،لازم است سایر اعضای خانواده حتی بدون علائم بررسی شوند.

